



Blaue Lupine (*Lupinus angustifolius*)

Hinweise für Anbau und Vermehrung der Blauen Lupine für die Sorten:
BOLIVIO, BOLTENSIA, BORA, BORLU, BOREGINE, VITABOR (Verzweigungstypen)
BORUTA (endständiger Typ)

Pflanzenschutz - Anthracnose

Die derzeit beste Strategie zur Bekämpfung bzw. Prophylaxe gegenüber der Anthracnose ist die Behandlung mit einem Azol in Verbindung mit einem Strobilurin. Als beste Kombination erwies sich eine Mischung von Folicur und Amistar mit jeweils 0,5 l/ha. Hier konnte die stoppende Wirkung des Folicurs mit der nachhaltigen Wirkung von Amistar verbunden werden. Der günstigste Zeitpunkt war aus bisheriger Sicht das Knospenstadium bis zum Blühbeginn.

Neuere Erkenntnisse gehen davon aus, dass die Primärinfektion von samenbürtigen Erregern erfolgt und ein Übergreifen in den Bestand von infizierten Pflanzen ausgeht. Diese zeigen in diesem frühen Stadium oft keine typischen und allgemein bekannten Verdrehungen der Stängel und Blätter. Zu diesem Zeitpunkt ist der Schutz der Pflanze durch die Beize nicht mehr gegeben. Günstige Bedingungen wie Feuchtigkeit und warme Temperaturen steigern nun das Ausbreiten des Pilzes.

Um diesen frühen Befall einzuschränken und die Verbreitung zu verhindern, sollte der bisherig genannte Termin vorverlegt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass es günstiger ist, die Applikation der Fungizide im Zeitraum Bestandesschluss bis Knospenstadium durchzuführen.

Zum jetzigen Zeitpunkt konnte noch kein Befall auf den Flächen beobachtet werden. Die momentane wechselhafte Witterung ist jedoch eher förderlich für die Verbreitung der Anthracnose, daher ist durchaus mit einem Befall zu rechnen. Die Gefahr darf keinesfalls unterschätzt werden, auch wenn in den letzten Jahren nur sehr wenig oder gar kein Befall festgestellt wurde.

Beachten Sie unbedingt die Empfehlungen und Prognosen der Pflanzenschutzämter. Führen Sie ständige Bestandeskontrollen durch, um auftretende Krankheiten effektiv bekämpfen zu können.

Sollten Sie einen Verdacht haben, dass eine Infektion erfolgte, informieren Sie uns bitte umgehend.

Anthracnosebefall

Symptome wie sie zum jetzigen Zeitpunkt auftreten könnten



welke, verdrehte und teilweise abgestorbene Pflanzen



verdrehte und verkrümmte Pflanzen, der typische Fleck, ist bei der Blauen Lupine nicht immer sichtbar